

S.A.B

SERVICE
ANTIPARASITAIRE
DE BRETAGNE

SAPHIR GRAIN

Usage Biocide: TP 14

AMM: FR-2014-0097

Composition:

- Brodifacoum 0,005 %

Classement et Toxicité



Protection individuelle:



ANTIDOTE:

Vitamine K1

Utiliser les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant ce produit.

FDS disponible sur:

www.antiparasitaire-bretagne.com

**SPECIALITE EXCLUSIVEMENT RESERVEE AUX
APPLICATEURS HYGIENISTES**

SAPHIR GRAIN associe le plus puissant des anticoagulants : le BRODIFACOUM à l'un des supports le plus appétent : l'avoine nue.

SAPHIR GRAIN est remarquablement efficace à très faible dose (une seule ingestion est suffisante) sur l'ensemble des rongeurs : surmulots, rats noirs, souris..., y compris sur les souches résistantes aux anticoagulants traditionnels.

Sa D.L. 50 est de 0,26 mg/kg p.v. sur le rat et de 0,40 mg/kg p.v. sur la souris ; soit des quantités d'appâts très faibles : 1,3 g pour un rat et 0,2 g pour une souris....

SAPHIR GRAIN contient un agent amérisant : le benzoate de dénatonium, qui diminue le risque d'ingestion par les enfants tout en étant indétectable par les rongeurs, à cette dose.

MODE ET PRECAUTIONS D' EMPLOI :

Disposer les appâts, en les protégeant, par postes de 10 à 40 g, uniquement dans les lieux et abris couverts; et leurs abords immédiats. Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Conserver les appâts non utilisés dans leur emballage d'origine, à l'écart des denrées alimentaires, y compris celles des animaux domestiques. Ne pas manger, ne pas boire, ne pas fumer pendant l'utilisation. En cas de malaise, consulter un médecin (si possible, lui montrer l'étiquette).

En cas d'intoxication, même par ingestion unique, il peut être nécessaire d'instaurer un traitement prolongé, sur plusieurs mois, par la vitamine K1. La durée de conservation de SAPHIR GRAIN est de deux ans minimum, dans son emballage d'origine.

